

## Patientinformation

### Vandscanning.

Undersøgelse af livmoderens inderside. Anvendes ved mistanke om polypper og/eller fibromer i livmoderhulen.

#### Hvordan

Livmoderhalsen afvaskes med Klorhexidin og der lægges et tyndt kateter op i livmoderhulen. Samtidig med ultralydsscanning sprøjtes lidt saltvand ind i livmoderhulen så der fås et nøjagtigt billede af slimhinden og dermed også evt. forandringer f.eks. polypper eller fibromer. Kateteret fjernes. Undersøgelsen varer ca. 5 min.

#### Normalt efterforløb

Undersøgelsen kan være forbundet med menstruationslignede smerter i livmoderen og lidt vandigt udflåd i timerne efter.

#### Komplikationer i efterforløbet

Der kan forekomme smerter i maven og i skuldrene det første døgn. Dette skyldes, at der kan blive skyllet lidt blod ud i bughulen sammen med den anvendte væske.

Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer. Om nødvendigt kan der tages smertestillende middel f.eks. Panodil 500 mg, højt 2 tabletter hver 6. time.

Vedvarer smerterne skal gynækologen eller vagtlæge kontaktes. I sjældne tilfælde kan der komme feber, og så skal du kontakte gynækolog, vagtlæge eller din egen læge.