

Patientinformation:

Information om keglesnit

Formålet:

Er at fjerne celleforandringer på livmodermunden og/eller i livmoderhalskanalen.

Hvordan foregår indgrebet?

Indgrebet foregår nogenlunde på samme måde som da du fik taget biopsier.

Først ses efter hvor forandringerne er på livmoderhalsen med en kikkert, herefter får du lagt lokalbedøvelse med en tynd nål. Når bedøvelsen virker, fjernes et kegleformet vævs stykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge. Den udtagne kegle bliver undersøgt mikroskopisk.

Svaret vil foreligge efter ca. 2 uge. Du skal selv ringe og få svaret på et aftalt tidspunkt.

Svaret vil vise graden af celleforandringer samt om det er fjernet i sundt væv eller om de går ud til kanten af keglen.

Du forventes at få tid til celleprøve (smear) og HPV podning her i klinikken om 6 mdr.

Efter indgrebet:

Du skal sidde 10-15 min. efter indgrebet for at sikre at du ikke bløder mere end tilladeligt.

I dagene efter kan der komme lidt blødning og det er normalt med rødbrunt eller gulligt udflåd op til 2 uger efter.

Gode råd:

- Såret på livmoderhalsen heler op i løbet af 2-4 uger.
- Efter 10-14 dage falder sårskorpen af, og der kan du forvente lidt frisk blødning.

Du bør i ophelingsfasen undgå:

- Karbad, svømmehal, havbad, tamponer, løb og samleje.

Ved blødning:

- Tag det med ro.

Du bør kontakte klinikken/lægevagten hvis du får:

- Kraftigere blødning end svarende til normal menstruation
- Feber og smerter
- Ildelugtende udflåd.

Fremtiden:

Keglesnittet vil normal ikke påvirke din evne for at blive gravid og føde normalt. Der kan dog være en lille risiko for at føde lidt for tidligt, men det sker kun for få procent.

Vaccine mod HPV:

Du kan overveje at få vaccinen mod HPV, hvis du ikke allerede har fået den.

Vaccinen beskytter ikke mod alle typer af livmoderhalskræft.