

## **Gynækologisk klinik**

Speciallæge Ditte Rørne  
Rosenørns allé 6, 3 tv.  
1634 København V.

Tlf. 35371326

## Vejledning om medicinsk abort Op til 8. graviditetsuge

*Det er særligt vigtigt at du møder til kontrol i et abort forløb- også selvom du bløder*

Skulle du bliver forhindret i at komme, bedes du ringe på 35371326 og lægge en besked med din CPR-nummer, senest 24 timer inden konsultation.

*Udeblivelse fra en tid i klinikken medfører en regning på **250 kr.***

## Medicinsk Abort indtil 9 ugers graviditet.

Du har valgt at få foretaget en medicinsk abort og har nu givet dit skriftlige samtykke til indgrebet.

**Det er vigtigt at du følger den vejledning og kommer til de aftalt kontroller.**

Der er d. / 20 gennemgået en klinisk undersøgelse med evt. podning, ultralydsscanning, information og udlevering af medicin og skriftelig vejledning.

Vi har aftalt kontrolbesøg.

Fremtidig prævention er drøftet.

Da aborten foregår hjemme anbefales det, at du har en voksen person hos dig det første døgn efter du har lagt Cytotec tabletterne op.

Er du usikker på noget kan du kontakt klinikken på **tlf.**

**35371326**. Ringer du udenfor telefontiden, kan du lægge en besked på vores telefonsvarer og du vil blive ringet op.

### Normale symptomer:

- Let kvalme
- Smerter som ved kraftig menstruation i 1-2 dage.
- Blødning om i begyndelsen af menstruation men aftager efter nogle dage.
- Pletblødninger og brunligt udflåd op til 3 uger

### Unormale symptomer:

- Langvarig Kraftig blødning (mere end kraftig mens i mere end 3 timer)
- Vedvarende opkastning
- Vedvarende stærke smerter eller kramper i underlivet
- Feber

**Har du brug for akut hjælp, nat eller weekend kontakt 1813.** Medbring i så fald denne pjece.

Der er ved UL d.

- Et intrauterint foster med CRL=        mm. Sv.t. GA        uger +        dage.
- En intrauterin gestationssæk med blommeseæk på        mm i diameter.
- En intrauterin gestationssæk på        mm
- Der er dd. Taget S-HCG

## Behandlingen

### **1.dag:**

En tbl. Mifegyne sluges hel

### **2-3.dag:**

Fire tbl. Cytotec oplægges i skeden.

Smertestillende behandling med Tbl. Panodil/Pinex/Pamol, max 2 tbl. 4 gange i døgnet og tbl. Ipren 200 mg, max 2 tbl. 4 gange i døgnet.

Hvis du skal starte på P-Piller, skal du starte i dag.

### **4-6.dag:**

Telefonkontrol. Du bliver ringet om af sygeplejesken, som kontrollerer, at aborten er startet.

### **14.dag:**

Kontrol i klinikken-Ultralydsscanning for at kontrollere at aborten er afsluttet fuldstændigt.